REMBOURSEMENT DE PRALUENT® (ALIROCUMAB)

Pas de demande de prise en charge des coûts nécessaire

PRALUENT® peut être initié directement sans demande préalable de prise en charge des coûts.[1] Si vous souhaitez néanmoins faire une demande écrite, vous pouvez utiliser ce document. **Vous trouverez la limitatio de Praluent® sur la liste des spécialités : www.sl.bag.admin.ch/sl**

Données médicales (exclusivement destinées au médecin-conseil)

☐ Nouveau patient

☐ Contrôle des résultats (remplir la partie 3)

Date du début du traitement avec PRALUENT® :

1. Anamnèse

Prévention secondaire : Adultes après un événement cardiovasculaire ischémique athérosclérotique cliniquement manifeste

☐ LDL-C sous traitement antérieur **> 1,8 mmol/L**

OU

Prévention primaire : Adultes avec une hypercholestérolémie familiale hétérozygote

☐ LDL-C sous traitement antérieur **> 2,6 mmol/L**

LDL-C avant l'initiation de PRALUENT® : _____ mmol/l

Date de la mesure : _____

2. Traitement antérieur

a) ☐ Régime alimentaire complémentaire

b) ☐ Traitement depuis au moins **3 mois à la dose maximale tolérée** d'un traitement hypolipémiant intensifié comprenant :

- ☐ **1 statine de haute intensité** (atorvastatine ou rosuvastatine) avec ou sans ézétimibe

OU

- ☐ au moins **2 statines qui ne sont pas de haute intensité** avec ou sans ézétimibe

OU

- ☐ **en cas d'intolérance avérée aux statines**# : ézétimibe depuis au moins 3 mois, avec ou sans autre hypolipémiant

Veuillez indiquer les statines utilisées :

Principe actif		Dose (maximale tolérée)	Preuve de l'intolérance aux statines #
Statine 1			☐ Myalgie ☐ Augmentation CK ≥ 5 × ULN ☐ Hépatopathie sévère
Statine 2			☐ Myalgie

3. Résultats thérapeutiques avec PRALUENT® dans les 6 mois

La thérapie ne peut être poursuivie que lorsqu'un contrôle dans les 6 mois après le début du traitement a montré une réduction d'au moins 40 % du LDL-C par rapport à la valeur initiale‡ sous traitement hypolipémiant intensif maximal ou qu'une valeur de LDL-C inférieure à 1,4 mmol / l a été atteinte.

LDL-C sous PRALUENT® : _____ mmol/l

Date de la mesure : _____

☐ Réduction du LDL-C vs. valeur initiale ≥ 40% **OU** ☐ Valeur de LDL-C < 1,4 mmol/l atteinte

CK = créatinine kinase ; **LDL-C** = low-density lipoprotein cholesterol (cholestérol à lipoprotéines de basse densité) ; **ULN** = upper limit of normal (limite supérieure de la normale).

1. Liste des spécialités Praluent®. www.sl.bag.admin.ch/sl, mise à jour : 01.03.2026. Les références peuvent être mises à disposition sur demande.

Une intolérance aux statines est considérée comme avérée si une tentative de traitement avec plusieurs statines a conduit à des myalgies ou à une augmentation de la créatine kinase (CK) d'au moins 5 fois la valeur normale supérieure ou si une hépatopathie sévère est survenue sous traitement avec une statine.
‡ Chez les patient·e·s ayant antérieurement reçu un traitement par un inhibiteur de la PCSK9 ou un réducteur de la PCSK9 (Inclisiran), la valeur initiale est la valeur de LDL-C sous traitement hypolipémiant intensif maximal avant le traitement par inhibiteur de la PCSK9/réducteur de la PCSK9.

Remboursement de Praluent / medforms.50.10.30.5010 / fr / V112 / MAT-CH-2201961-6.0/2026

REMBOURSEMENT DE PRALUENT ® (ALIROCUMAB)

Pas de demande de prise en charge des coûts nécessaire

Données personnelles du patient (de la patiente)

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA :

Ville :

Date de naissance :

N° de l'assuré.e :

c/o Médecin-conseil

Assurance maladie

Nom :

Complément d'adresse (médecin-conseil) :

Adresse de l'assurance :

NPA :

Ville :

Médecin traitant

Le diagnostic, la prescription initiale et les contrôles réguliers doivent être effectués par des médecins spécialistes FMH en angiologie, diabétologie / endocrinologie, cardiologie, néphrologie ou neurologie.[1]

Spécialité FMH :

Nom :

Prénom :

Titre :

Adresse :

Complément d'adresse :

NPA :

Ville :

Tel. :

Fax :

Email :

Si à l'hôpital, ajoutez le nom de l'hôpital :

Département :

Date :

Signature :

Praluent®. **PA:** alirocumab. **I:** en complément d'un régime alimentaire et d'une statine à la dose maximale tolérée +/- autre traitement hypolipémiant chez l'adulte présentant une hypercholestérolémie (incluant l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote) et chez les enfants à partir de 8 ans présentant une hypercholestérolémie familiale hétérozygote nécessitant une réduction complémentaire du cholestérol LDL-C. Réduction du risque d'événements cardiovasculaires (IM, AVC ischémique, AI nécessitant une hospitalisation)chez les patients à risque cardiovasculaire élevé. **P:** chez les adultes, dose initiale recommandée (injection s.c.) 75 mg 1x toutes les 2 semaines. Autres dosages: 300 mg1x toutes les 4 semaines ou dose maximale 150 mg 1x toutes les 2 semaines. Chez les enfants à partir de 8 ans, ajustement posologique nécessaire en fonction du poids. **CI:** hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. **MP:** réactions allergiques générales, y compris le prurit, l'hypersensibilité, l'eczéma nummulaire, l'urticaire et la vascularited'hypersensibilité ; en cas de réactions allergiques graves arrêter le traitement. Des angiooedèmes ont été rapportés dans le cadre d'études observationnelles. **IA:** pasd'effet pharmacocinétique sur d'autres médicaments. Pas d'influence sur l'efficacité par des thérapies qui accroissent PCSK9 (comme les statines et autres hypolipémiants).**EI:** réactions au site d'injection, symptômes des voies aériennes supérieures, douleursmusculosquelettiques, prurit, diarrhée, infection des voies urinaires. Pr: 75 mg : solutioninjectable en stylo prérempli avec bouton d'activation : boîtes de 1, 2 ou 6 stylos ; sans bouton d'activation : boîtes de 1 ou 2 stylos. 150 mg : solution injectable en stylo prérempli avec bouton d'activation : boîtes de 2 ou 6 stylos ; sans bouton d'activation : boîte de 2 stylos. 300 mg : solution injectable en stylo prérempli sans bouton d'activation : boîte de 1 stylo. **Cat.rem.:** B*. **Tit.AMM:** sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE. **MàJ:** juin 2025. Pour de plus amples informations, voir l'information destinée aux professionnels sur www.swissmedicinfo-pro.ch.